

Concentrado Destete Precoz LA PALMERA



El destete precoz es una herramienta que permite mejorar el estado corporal de las vacas de cría y como consecuencia, el porcentaje de preñez.

Numerosas experiencias avalan nuestras afirmaciones.

Destete Precoz – Preñez

Establecimientos	Fecha	Categoría	Cabezas	% de Preñez	E. Corporal	Distrib. De la Preñez
La Monona	24/11/2005	2do. Servicio	169	93%	4	50 - 40 - 10
La Juguetona	16/12/2005	2do. Servicio	275	95%	3	50 - 40 - 10
San Juan	17/01/2006	2do. Servicio	135	96%	4	60 - 30 - 10
La Belela	17/01/2006	2do. Servicio	166	95%	4	50 - 40 - 10
El Tejar	12/12/2005	2do. Servicio	373	90%	4	50 - 40 - 10
El Puesto	06/01/2006	Vaca 3-4 P	332	89%	4	55 - 35 - 10
La Belela	17/01/2006	Vaca 3 P	28	97%	4	50 - 40 - 10
R. de Corrientes		Vaca 3 P	1818	95%	3	51 - 23 - 13 -13
El Alegre	06/01/2006	R.General	251	92%	4	40 - 45 - 15
Maryland	14/11/2005	R.General	185	96%	4	60 - 30 - 10
Santa María	15/10/2005	R.General	150	90%	4	60 - 30 - 10
El Tejar	12/12/2005	Vaca Cola	352	90%	4	50 - 40 - 10

En todos los casos se lograron porcentajes de preñez que superaban el 90%.
Nótese la distribución de las preñeces, tempranas en casi todos los casos.

En cuanto a los terneros los aumentos de peso promediaron 0,600 kg/día durante los 2 meses siguientes al destete.

Destete Precoz - Terneros

Establecimientos	Fecha	Cabezas	Peso Inicial	1er. Mes (Kg/día)	2do Mes (Kg/día)	Promedios (Kg.)	Últimas Pesadas
La Monona	24/11/2005	169	74	0,7	1	0,850	Junio 285 Kg.
El Alegre	06/01/2005	243	85	1,46	0,903	1,18	Junio 204 Kg.
Maryland	14/11/2005	182	103	0,767	0,7	0,733	Febrero 171 Kg.
La Belela (Corral 1)	17/01/2005	127	95	0,583	0,583	0,583	Marzo 131 Kg.
La Belela (Corral 2)	17/01/2005	271	109	0,645	0,645	0,645	Marzo 148 Kg.
La Belela (Corral 3)	17/01/2005	223	121	0,583	0,583	0,583	Marzo 157 Kg.
El Tejar	12/12/2005	159	80	0,791	0,791	0,791	Abril 175 Kg.
Santa María	15/10/2005	146	105	0,533	0,533	0,533	Marzo 185Kg.

El alimento de Destete Precoz de Molino La Palmera fue utilizado también en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con vacas en muy mal estado corporal, como



Molino LA PALMERA – Rutas 5 y 47 – LUJÁN (BA)

02323-425814/430883

www.molinolapalmera.com.ar

se puede apreciar en la fotografía. En este caso se habían dejado lotes

Vaq. 2do. servicio

Servicio	Tratam.	Preñ.	Vacías	Preñez
2004/5	D.Precoz	300	35	90%
2004/5	D. Conv.	124	278	31%
2005/6	D.Precoz	148	15	91%
2005/6	D. Conv.	29	48	38%

testigo y los resultados en cuanto a preñez fueron impactantes. Asimismo fueron muy buenos los resultados con los terneros, a pesar de que viajaron 1.000 Km. en camión luego del destete.

Evolución de los terneros

PESO DE LOS TERNEROS				
FECHA	25/11/2004	14/12/2004	28/12/2004	28/01/2005
PESO	93	100	112	134

PERÍODOS		DÍAS	AUMENTO (Kg. /día)
25/11/2004	14/12/2004	19	0,400
14/12/2004	28/12/2004	14	0,840
28/12/2004	28/01/2005	31	0,799
25/11/2004	28/01/2005	64	0,640

El Destete Precoz permite :

- Recuperar las reservas corporales, mejorando el comportamiento reproductivo.
 - Obtener más cabeza de parición.
 - Aplicarlo en forma selectiva (vaquillonas de segundo servicio, vacas cola de parición, vacas CUT, vacas flacas.)
 - Disminuir los requerimientos de los vientres, permitiendo tener más vacas con las misma oferta forrajera.
 - Independizar la parición de la época del año, donde puede ser interesante en algunos sistemas de producción.
-

El destete se puede realizar sin problemas a partir de los 60 días de vida. Esto quiere decir que los terneros más chicos del lote deben tener al menos 60 días. Si hay terneros de menor edad se los debe apartar y suministrarles nuestro

alimento para Destete Supe Precoz La Palmera, apto para terneros de más de 40 días. El proceso de separación de las madres debe ser brusco, dejando los terneros en el corral y llevando las vacas lo más lejos posible. Otra manera es a “culata de camión” cuando los terneros deben llevarse a otro establecimiento. El corral en que se ubican los terneros debe tener buenos alambrados pues durante los primeros días los terneros tratarán de salir, especialmente si pueden oír el mugido de las vacas. El corral deberá disponer de un bebedero limpio con agua en todo momento. Se ubicará el comedero en el centro del corral y en él se colocará fardo de alfalfa de buena calidad y, sobre el fardo, se colocará la ración formada por 25% de concentrado y 75% de maíz entero (no molido), bien mezclados. El concentrado contiene un saborizante para facilitar el acostumbramiento a la ración, de modo que rápidamente los terneros comienzan a consumir la ración y se olvidan de la leche materna. Los primeros días es mejor mezclar el maíz con el concentrado antes de distribuirlo; pero cuando ya no se dé pasto en el comedero la mezcla puede hacerse en el mismo siempre que se tome la precaución de alejar los terneros mediante un alambre eléctrico a fin de poder trabajar cómodamente y lograr una mezcla homogénea. Durante los primeros 25 días a corral se puede estimar un consumo de ración de 1 Kg. por día, o sea, 250 gramos de concentrado y 750 gramos de maíz. Terminado este período a corral pueden salir a pastoreo, siempre que se disponga de una pastura o verdeo de calidad. Aconsejamos continuar con la suplementación durante este período, a razón de 1 kg diario, pero disminuyendo el concentrado, haciendo una ración de 20% de concentrado y 80% de maíz. La estrategia a seguir dependerá de la disponibilidad forrajera. En zonas subtropicales, con gramíneas C4 y escasas leguminosas sugerimos seguir con la suplementación durante mas tiempo.

Uno de los problemas que puede presentarse durante el destete es la coccidiosis. El Concentrado DP LA PALMERA contiene monensina que es un coccidiostático, de modo que sólo hay que ejercer control los primeros 4 o 5 días, en que el consumo de alimento puede no ser suficiente para aportar la cantidad de

monensina requerida. Debe consultarse con un profesional veterinario si hay terneros afiebrados o con diarreas sanguinolentas.